


**MORTALIDAD POR CÁNCER DE ESTÓMAGO EN GUAYAQUIL.  
PERÍODO 2009-2018**

El cáncer de estómago representa entre las causas de muerte uno de los más importantes, con una variación de la incidencia y mortalidad en esta década. Sin embargo, existen diferencias en las ciudades y regiones de cada país.





En la ciudad de Guayaquil, se ha observado que la mortalidad ha venido de manera sostenida en esta década con algunos picos de incremento; observándose en el año 2009 de 6,20 muertes, 2013 de 5,91 muertes, hasta el año 2018 de 6,32 muertes por 100.000 habitantes.

En cuanto a la tasa de mortalidad por sexo, los hombres fueron afectados mayormente, con una presentación de tendencia sostenida al incremento en los últimos años, de igual forma pasa con las mujeres.



De acuerdo a la tasa de mortalidad según sexo y grupo etario, en ambos sexos el grupo de 45 – 59 años de edad presenta una tendencia al incremento en los últimos años. Sin embargo, sigue siendo el grupo de 65 – 74 años el de mayor tasa de mortalidad, pero este grupo se ha mantenido presente y tiene una tendencia a decrecer.



Fuente: Registro de Tumores de Guayaquil / INEC

Elaboración: Departamento de Bioestadística. SOLCA –Guayaquil /septiembre 2019 / Dr. Jhony Real Cotto; Ing. Leyda Jaramillo Fejoo; Dra. Rina Quinto Briones



Revisión: Gerencia hospitalaria / Comité de Tumores Digestivos

**TASA DE AÑOS DE VIDA POTENCIALMENTE PERDIDOS POR CÁNCER DE ESTÓMAGO EN MENORES DE 75 AÑOS, GUAYAQUIL. PERÍODO 2009-2018**



Es importante medir la mortalidad en nuestros países y en sus regiones; tomándose la mortalidad en el cáncer de Estómago, se revisa el indicador de Años de Vida Potencial Perdidos (AVPP), que mide el impacto que tienen las muertes prematuras para una población; utilizando la esperanza de vida promedio en el Ecuador de 75 años (referencia para este

indicador), del que se obtuvo en Guayaquil para el año 2009, la pérdida de 1,09 año por cada mil habitantes, mientras que en el 2014 fue de 1,26 y en 2018 de 1,14; que expresa una sostenibilidad de la presencia del cáncer de estómago.



A través del indicador AVPP según sexo y grupo de edad, se señala que, por el cáncer de Estómago están falleciendo más tempranamente los hombres. Entre ambos sexos se tuvo un mayor peso de años perdidos en el grupo de 45 – 59 años, donde se perdieron un total de 11.970 años durante esta década; además, se observa una presencia importante de AVPP en el grupo etario de 30 - 44 en el periodo estudiado con una pérdida de 7.387 años, siendo más en hombres el incremento; los restante grupos de edad se mantienen de forma constante año a año, pero con presencia importante en el grupo de 60 – 74 años. Los AVPP en hombres tuvo una variación de incremento de muertes en el 2014 para luego estabilizarse y tener una de tendencia de disminución y en este último año al incremento, en cuanto a las mujeres es más estable en los diferentes grupos su comportamiento del indicador de AVPP.

Fuente: Registro de Tumores de Guayaquil / INEC

Elaboración: Departamento de Bioestadística. SOLCA –Guayaquil /septiembre 2019 / Dr. Jhony Real Cotto; Ing. Leyda Jaramillo Feijoo; Dra. Rina Quinto Briones

Revisión: Gerencia hospitalaria / Comité de Tumores Digestivos