


**MORTALIDAD POR CÁNCER DE CÉRVIX EN GUAYAQUIL.
PERÍODO 2009-2018**


El cáncer cervicouterino es considerado un problema a nivel mundial y sigue siendo importante entre los más frecuente en las mujeres. Se ha considerado que, debido al acceso limitado a los servicios de detección y tratamiento, la gran mayoría de las defunciones ocurre entre mujeres que viven en países de ingresos bajos y medianos, considerando el aumento de la mortalidad prematura por este tipo de cáncer en mujeres de 15 a 44 años, por lo que requiere urgentemente un profundo análisis, según la OPS/OMS.

Conociendo que el cáncer de cuello uterino es el segundo cáncer más frecuente en mujeres después del de mama en el mundo y para Ecuador, la tasa de cáncer en mujeres fue 134,9, y de 125,9 casos en hombres por cada 100.000 habitantes; donde el cáncer de mama y cérvix ocupan los dos primeros lugares (Globocan 2012).




En Guayaquil, la presentación de una de las patologías frecuentes en mujeres es el cáncer de cérvix invasor, y con relación a la mortalidad, en menores de 75 años, la tasa ha tenido una tendencia a estabilizarse e ir decreciendo en los últimos años observándose una tasa de 7,05 en el 2009; 5,65 en el 2011; 4,51 en 2014 y en el 2018 con 4,24 muertes por cada 100.000 mujeres.

Durante el periodo analizado, la mayor tasa de mortalidad se presentó en las mujeres de 60-74 años, con una tendencia a estabilizarse y de igual manera le sigue en importancia el grupo de 45-59 años entre los más importantes; el grupo de 33 – 44 años la tendencia se mantiene estable en forma anual; del grupo de 15 a 29 años es decreciente y sin fallecimientos en los últimos dos años.



**TASA DE AVPP POR CÁNCER DE CÉRVIX EN MUJERES MENORES DE 75 AÑOS
GUAYAQUIL. PERÍODO 2009-2018**

La mortalidad en los países en desarrollo ha evolucionado, requiriendo un análisis cada período; y en referencia a la mortalidad del cáncer de Cérvix, se incluye el indicador de Años de Vida Potencial Perdidos (AVPP), que mide el impacto que tienen las muertes prematuras para una población; es decir, cuando más prematura es la muerte, mayor es la pérdida de vida;



utilizando la esperanza de vida promedio en el Ecuador de 75 años, como referencia para este indicador. En Guayaquil se obtuvo, para 2009 la pérdida de 1,6 años; en 2014 de 1 año mientras que en el 2018 fue de 0,8 años por cada mil mujeres menores de 75 años; con una tendencia a la disminución en esta década.



A través del indicador AVPP, se demuestra que, por el cáncer de Cérvix están falleciendo con un mayor peso de años perdidos en el grupo de 45 – 59 años, donde se perdieron un total de 6.187 años durante esta década en ese grupo etario; además, se observa una presencia importante de AVPP en el grupo etario de 30 a- 44 en el periodo estudiado con una pérdida de 5.475 años; estando presente de manera sostenida el grupo de 60 – 74 años y con presencia

en el grupo de 15 – 29 años en algunos años de este período analizado.