



**MORTALIDAD POR CÁNCER DE ESTÓMAGO EN GUAYAQUIL.
PERÍODO 2010-2019**

Entre las causas de muerte más importantes en esta década, el cáncer de estómago representa uno de ellos. Sin embargo, existen diferencias en las ciudades y regiones de cada país.



En la ciudad de Guayaquil, se ha observado que la mortalidad en general ha venido presentándose con un comportamiento de manera sostenida en esta década; observándose en el año 2010 de 6,3 muertes, 2013 de 5,9 muertes, 2016 de 5,4 muertes y el año 2019 de 5,8 muertes por 100.000 habitantes.

En cuanto a la tasa de mortalidad por sexo, los hombres fueron afectados mayormente, con una presentación de tendencia sostenida en los últimos años, presentado en el 2010 con 7,7 muertes, 2013 de 6,6 muertes, 2016 de 6,9 muertes y el año 2019 de 7,4 muertes por 100.000 habitantes. De igual forma pasa con las mujeres en el 2010 con 4,9 muertes, 2013 de 5,2 muertes, 2016 de 4,8 muertes y el año 2019 de 4,1 muertes por 100.000 habitantes. De acuerdo a la tasa de mortalidad según sexo y grupo etario, en ambos sexos el grupo de 65 – 74 años de edad sigue siendo el de mayor tasa de mortalidad con una tendencia sostenida en los últimos años. Seguido del grupo de 45 – 59 años en ambos sexos en menor proporción, y se ha mantenido presente tasas en menor proporción en el grupo etario de 30 – 44 años. Además, se observa la presencia esporádica en el grupo de 15 – 29 años de edad.




Fuente: Registro de Tumores de Guayaquil / INEC

Elaboración: Departamento de Bioestadística. SOLCA –Guayaquil /noviembre 2020 / Dr. Jhony Real Cotto; Ing. Leyda Jaramillo Feijoo; Rina Quinto Briones

Revisión: Gerencia hospitalaria / Comité de Tumores Digestivos

TASA DE AÑOS DE VIDA POTENCIALMENTE PERDIDOS POR CÁNCER DE ESTÓMAGO EN MENORES DE 75 AÑOS, GUAYAQUIL. PERÍODO 2020-2019




Es importante medir la mortalidad en nuestros países y en sus regiones; tomando la mortalidad en el cáncer de Estómago, se revisa el indicador de Tasa de Años de Vida Potencial Perdidos (AVPP), que mide el impacto que tienen las muertes prematuras para una población; utilizando la esperanza de vida promedio en el

Ecuador de 75 años (referencia para este indicador), del que se obtuvo en Guayaquil para el año 2010, la pérdida de 1,1 año por cada mil habitantes, mientras que en el 2013 fue de 1,0, en 2016 de 1,0 y en el año 2019 de 1,0; que expresa una sostenibilidad de indicador de tasa de AVPP del cáncer de estómago. Con una tasa de AVPP mayor en hombres en esta década.



A través del indicador AVPP según sexo y grupo de edad, se señala que, por el cáncer de Estómago están falleciendo más tempranamente los hombres. Entre ambos sexos se tuvo un mayor peso de años perdidos en el **grupo etario de 45 – 59 años**, donde se perdieron un total de **13.020 años** durante esta década; además, se observa una presencia importante de AVPP en el **grupo etario de 30 - 44** en el periodo estudiado con una pérdida de **8.437 años**, siendo más en hombres el incremento; los restante grupos de edad se mantienen de forma constante año a año, pero con presencia importante en el grupo de 60 – 74 años. Los AVPP en hombres tuvo una variación de incremento de muertes en el 2014 para luego estabilizarse y tener una de tendencia en el último año al incremento, en cuanto a las mujeres es más estable en los diferentes grupos su comportamiento del indicador de AVPP.



Fuente: Registro de Tumores de Guayaquil / INEC

Elaboración: Departamento de Bioestadística. SOLCA –Guayaquil /noviembre 2020 / Dr. Jhony Real Cotto; Ing. Leyda Jaramillo Feijoo; Rina Quinto Briones

Revisión: Gerencia hospitalaria / Comité de Tumores Digestivos