


**MORTALIDAD POR CÁNCER DE CÉRVIX EN GUAYAQUIL.
PERÍODO 2008-2017**


La Organización Panamericana de la Salud en el 2013 considera al cáncer cervicouterino un problema a nivel mundial, y es el segundo cáncer más frecuente entre las mujeres. Es de anotar, que, debido al acceso limitado a los servicios de detección y tratamiento, la gran mayoría de las defunciones ocurre entre mujeres que viven en países de ingresos bajos y medianos, considerando el aumento de la mortalidad prematura por este tipo de cáncer en mujeres de 15 a 44 años, por lo que requiere urgentemente un profundo análisis.




Conociendo que el cáncer de cuello uterino es el segundo cáncer más frecuente en mujeres después del de mama en el mundo y según proyecciones del Globocan 2012 para Ecuador, la tasa de cáncer en mujeres fue 134,9 por cada 100.000 mujeres; donde el cáncer de mama y cérvix ocupan los primeros lugares.

El cáncer de cérvix es un tumor maligno de presentación frecuente en mujeres en Guayaquil, y con relación a la mortalidad, en menores de 75 años, la tasa ha tenido una tendencia a estabilizarse e ir decreciendo en los últimos años observándose una tasa de 3,05 en el 2008, en el 2011 con 2,86; 2014 con 2,28 y 2017 con 2,21 muertes por cada 100.000 mujeres.

Durante el periodo analizado, la mayor tasa de mortalidad se presentó en las mujeres de 60-74 años, con una tendencia al decrecimiento. Le sigue en importancia el grupo de 45-59 años, y así como los demás grupos etarios la tendencia se mantiene estable en forma anual.




**TASA DE AVPP POR CÁNCER DE CÉRVIX EN MUJERES MENORES DE 75 AÑOS
GUAYAQUIL. PERÍODO 2008-2017**



La mortalidad en los países en desarrollo ha evolucionado, requiriendo un análisis cada cierto período; y en cuanto a la mortalidad en el cáncer de Cérvix, en el que se incluye el indicador de Años de Vida Potencial Perdidos (AVPP), midiendo el impacto que tienen las muertes prematuras para

una población; es decir, cuando más prematura es la muerte, mayor es la pérdida de vida; en que se usó la esperanza de vida promedio en el Ecuador de 75 años, como referencia para este indicador. En Guayaquil se obtuvo, para 2008, la pérdida de 0.70 años por cada mil mujeres, mientras que en el 2017 fue de 0,46.



A través del indicador AVPP, se demuestra que, por el cáncer de Cérvix están falleciendo con un mayor peso de años perdidos en el grupo de 45 – 59 años, donde se perdieron un total de 6.502 años durante esta década; además, se observa una presencia importante de AVPP en el grupo etario de 30 a 44 en el periodo estudiado con una pérdida de 5.625 años; los restante grupos de edad se mantienen constante año a año.