



**MORTALIDAD POR CÁNCER DE COLON - RECTO EN GUAYAQUIL.
PERÍODO 2010-2019**





Uno de los graves problemas de salud pública es el cáncer, y es causante del 17% de las muertes en el mundo; aproximadamente un tercio de ellas se debe a cinco factores de riesgo potencialmente modificables: alto índice de masa corporal, baja ingesta de frutas y verduras, consumo de cigarrillos, estilo de vida sedentario y consumo de alcohol, lo

que indica que el cáncer es en gran parte prevenible, por lo que se requiere de un profundo análisis.


El cáncer de colon y recto ocupan lugares importantes en la incidencia en Guayaquil; la mortalidad no ha sido la excepción, ya que en la misma se ha observado un aumento de forma sostenida, siendo en el año 2010 la tasa de Mortalidad por 100.000 habitantes de 3,4 en 2013 fue 4,2; 2016 de 4,7 y en el año 2019 de 4,6; donde mayormente fueran afectadas las mujeres.



De acuerdo al sexo se observó poca diferencia entre hombres y mujeres con respecto a los grupos etarios mayormente afectados, los mismos que fueron de 60 – 74 años, seguido de 45 – 59 años de edad según su tasa de mortalidad. Cabe indicar que en las mujeres la tendencia es al incremento mientras que en los hombres tiende a estabilizarse en el grupo de mayor afectación.




**TASA DE AVPP POR CÁNCER DE COLON – RECTO EN MENORES DE 75 AÑOS
GUAYAQUIL. PERÍODO 2010-2019**





Este indicador epidemiológico de mortalidad, permite observar el impacto de la enfermedad, de acuerdo al sexo y la edad. En la última década en Guayaquil se ha observado un comportamiento fluctuante hacia el incremento durante esta década en menores de 75 años, (edad que es el

promedio de la esperanza de vida en el Ecuador). En el año 2010 la tasa de AVPP por 1000 habitantes fue de 0,6, en 2013 fue 0,8; 2016 de 0,9 y en el año 2019 de 0,9 años de vida potencialmente perdidos en mujeres menores de 75 años por cada 1000 habitantes. En cuanto a la tasa de AVPP por sexo, se observó fluctuación en su comportamiento tanto en hombres como en mujeres



Lo referente a los años de vida perdidos según el sexo y grupo de edad afectado, se observó tanto en hombres como mujeres que el grupo de 45-59 años es donde se encuentra el mayor peso de la mortalidad; sin embargo, se evidencia un cambio en los adultos jóvenes de 30-44 años y en edades menores a 30 años amerita efectuar un análisis detallado sobre los factores que influyen en estas muertes prematuras. Con una pérdida de **7988 años** en el **grupo etario de 45-59 años**, y de **4275 años** del **grupo etario de 30-44 años** en ambos sexos.



Fuente: Registro de Tumores de Guayaquil / INEC

Elaboración: Gestión de la Información y Productividad. SOLCA –Guayaquil /noviembre 2020 / Dr. Jhony Real Cotto; Ing. Leyda Jaramillo Feijoo; Rina Quinto Briones

Revisión: Gerencia hospitalaria / Comité de Tumores Digestivos