



**MORTALIDAD POR CÁNCER DE PULMÓN EN GUAYAQUIL.
PERÍODO 2009-2018**





El cáncer de Pulmón constituye un problema de salud en el mundo por su elevada mortalidad y su incidencia sigue ascendente en los últimos años. En Guayaquil, la tasa de mortalidad está teniendo una tendencia a la disminución durante esta década observada, de manera general se obtuvo una tasa en el 2009 de 4,03, en 2015 de 3,44 y al 2018 de

3,07 por 100.000 habitantes.

En relación al sexo se presta atención a una disminución de la Tasa en los hombres de 4,55 en el año 2009 a 3,10 muertes por 100.000 habitantes en el 2018, de igual manera en las mujeres que tuvo un descenso de la Tasa del año 2009 con 3,53 al 2018 de 3,03 muertes por 100.000 habitantes.



Entre los grupos etarios mayormente afectados en hombres y mujeres fueron de 60 – 74 años, seguido de 45 – 59 años de edad, pero en los hombres se estabiliza y tiende a disminuir, mientras que en las mujeres la tendencia se mantiene. Además, esta causa de muerte se encuentra dentro de las cinco primeras del cáncer en Guayaquil y es la primera en el mundo.




Fuente: Registro de Tumores de Guayaquil / INEC

Elaboración: Departamento de Bioestadística SOLCA –Guayaquil/ noviembre 2019 / Dr. Jhony Real Cotto; Ing. Leyda Jaramillo Feijoo; Dra. Rina Quinto Briones


Revisión: Gerencia hospitalaria / Comité de tumores de Pulmón y Sistema Respiratorio

TASA DE AÑOS DE VIDA POTENCIALMENTE PERDIDOS POR CÁNCER DE PULMÓN EN MENORES DE 75 AÑOS, GUAYAQUIL. PERÍODO 2009-2018



Los países cada cierto período, requieren medir la mortalidad y observar su comportamiento; esto se lo realiza mediante la medición del impacto que tienen las muertes prematuras para una población; en lo referente a la mortalidad por el cáncer de Pulmón, se incluye el indicador de Años de Vida

Potencial Perdidos (AVPP), utilizando la esperanza de vida promedio en el Ecuador que es de 75 años; como referencia para este indicador. Obteniéndose en la ciudad de Guayaquil para el año 2009, la pérdida de 0.61 años, mientras que en el 2014 fue de 0.71 y en 2018 de 0.41 años por cada mil habitantes; que expresa de manera general el decrecimiento de AVPP en el cáncer de Pulmón en Guayaquil durante esta década analizada.



Además, se demuestra que, por el cáncer de Pulmón están falleciendo más los hombres; y a través del indicador AVPP entre ambos sexos se tuvo un mayor peso de años de vida perdidos fue en el grupo de 45 – 59 años, seguido del grupo de 60 – 74 años durante esta década; también, se observa una presencia importante de AVPP en el grupo etario de 30 - 44 en este periodo estudiado en las mujeres.

Cabe indicar, que los AVPP en hombres tuvo una variación de muertes en el 2014 para posteriormente estabilizarse y tener una tendencia de disminución en el grupo de 45 – 59 años; en cuanto a las mujeres en los diferentes grupos a partir de los 30 años el comportamiento es a sostenerse del indicador de AVPP.